

Canapa, cocaina, ecstasy & Co. 2023


Infodrog analizza dal 2012 i questionari delle persone che fanno uso di sostanze psicoattive in modo ricreativo, fornendo una panoramica della realtà di questi consumatori, difficilmente raggiungibili da altre offerte di aiuto nelle dipendenze. I dati non rappresentativi provengono dal «Sondaggio sui comportamenti di consumo ricreativo di sostanze», compilato nel 2022 durante un'analisi drug checking, una consulenza o sui siti web dei servizi partner.



Frequenza del consumo

Il tabacco e la cannabis sono le sostanze più spesso utilizzate e anche il consumo di alcol è molto diffuso. Almeno il 50% delle persone che si sono espresse hanno fatto uso di benzodiazepine e farmaci oppioidi per 3 o più giorni negli ultimi 30 giorni.

Numero di giorni in cui è stata consumata una sostanza negli ultimi 30 giorni (solo per le persone con consumo negli ultimi 30 giorni) / n=numero di risposte valide / Risposte multiple possibili



Quantità consumate

Il gruppo delle persone fino a 18 anni è significativamente al di sopra della media del campione complessivo in termini di quantità consumate l'ultima volta prima del sondaggio per le sostanze elencate di seguito.

Quantità consumate durante l'ultima occasione di consumo prima del sondaggio e per quanto riguarda le sostanze psicoattive consumate negli ultimi 12 mesi (selezione)


Sostanza	Campione complessivo (media)	Fino a 18 anni (media)
Alcol	4,5 bibite standard	5,6 bibite standard
MDMA / Ecstasy	1,4 pillole / 174,9 mg	1,74 pillole / 201 mg
Anfetamina	0,5 g	0,82
Ketamina	199,9 mg	227 mg
2C-B	17 mg	19 mg

Partner

- 1 | DIBS, Safer Dance Basel
- 2 | DIZ, Saferparty
- 3 | CONTACT Nightlife, rave it safe
- 4 | Nuit Blanche?
- 5 | DILU


Età (n=2006)

La maggior parte delle persone che si sono espresse hanno meno di 18 anni o sono giovani adulti.




Sesso (n=2029)

7 persone su 10 sono uomini.



Formazione (n=2008)


Oltre l'80% ha completato una formazione e un terzo ha conseguito un titolo di una scuola superiore. Inoltre più dell'80% è in formazione e/o lavora (non figura nell'illustrazione).



Problemi a breve termine legati al consumo (selezione)

(n=1824 / Risposte multiple possibili)


Nel 2022, 83% delle persone hanno dichiarato di avere un problema a breve termine in relazione al consumo di sostanze psicoattive.



Problemi a lungo termine legati al consumo (selezione)

(n=1791 / Risposte multiple possibili)


Quasi due terzi ha avuto problemi a lungo termine legati all'uso di sostanze psicoattive.



Persone che hanno richiesto un'analisi drug checking – sostanze analizzate

I campioni di MDMA (pillole/cristalli) e di cocaina sono stati più frequentemente consegnati per l'analisi.


Percentuale di sostanze consegnate per il drug checking (n=587)



Consumo misto

Percentuale di persone che hanno praticato il consumo misto negli ultimi 12 mesi, per età e sesso; dati in percentuale, n=numero di risposte valide.

Quasi tre quarti delle persone che si sono espresse ha fatto uso di più sostanze in tempi ravvicinati negli ultimi 12 mesi. Il consumo misto è più frequente nella fascia d'età più giovane.




Consumo misto: ● Non ● Oui

Prevalenza a 30 giorni dal consumo di medicinali

La prevalenza a 30 giorni dal consumo di medicinali tra i minori di 18 anni che si sono espressi è nettamente superiore rispetto al campione totale.

Paragone tra minorenni e giovani adulti con il campione totale; n=numero di risposte valide



● Benzodiazepine ● Farmaci oppioidi ● Medicamenti ADHD ● Altri medicinali

Conclusioni

- Tabacco, cannabis e alcol sono le sostanze utilizzate più frequentemente dalle persone che ne fanno un uso ricreativo e che si sono espresse. Tuttavia, cocaina, anfetamine, benzodiazepine e farmaci oppioidi sono stati utilizzati da circa la metà delle persone per almeno 3 o più giorni negli ultimi 30 giorni.
- La percentuale di consumo di medicinali tra i minori di 18 anni è significativamente più alta di quella del campione complessivo.
- È inoltre preoccupante che la quantità consumata nell'ultima occasione di consumo prima della raccolta dei dati sia più alta nella stessa fascia d'età (≤ 18 anni) rispetto al campione complessivo.
- Le sostanze più frequentemente testate nell'ambito di un'analisi drug checking sono MDMA e cocaina.