


Canapa, cocaina, ecstasy & co. 2023

Dal 2012 Infodrog fornisce un'analisi sul consumo di sostanze psicoattive in contesti ricreativi. I dati presentati in questa scheda sono stati raccolti nel 2023 mediante un questionario proposto a utenti di drug checking e a persone che hanno sollecitato una consulenza oppure messo a disposizione sui siti web di servizi partner. La valutazione di questi dati non rappresentativi aiuta a tracciare un quadro delle abitudini di queste consumatrici e di questi consumatori, che i servizi di accompagnamento alle dipendenze riescono a raggiungere con difficoltà.

Prevalenza a 30 giorni

Nei 30 giorni precedenti l'indagine, la sostanza più sovente consumata è stata l'alcol, seguito da tabacco e cannabis. Anche la prevalenza di cocaina e MDMA nei 30 giorni precedenti il sondaggio è elevata. Sempre nello stesso periodo, si osserva anche un aumento del consumo di ketamina.


Prevalenza a 30 giorni del consumo di diverse sostanze rispetto al campione totale / n=2'614 risposte valide



Frequenza del consumo nei 30 giorni precedenti

Tabacco e cannabis sono le sostanze consumate con maggiore frequenza. Anche il consumo di alcol è molto diffuso. Rispetto all'anno precedente, il consumo di cocaina, MDMA, LSD, ketamina e benzodiazepine si è fatto più frequente.

Giorni durante i quali una sostanza è stata consumata nel corso dei 30 giorni precedenti (solo chi ha indicato di aver consumato nei 30 giorni precedenti) / n=numero di risposte valide / risposte multiple possibili




Partner

- 1 | DIBS, Safer Dance Basel
- 2 | DIZ, Saferparty
- 3 | CONTACT Nightlife, rave it safe
- 4 | Première ligne, Nuit Blanche
- 5 | Verein Kirchliche Gassenarbeit, DILU


Età (n=2'618)

La maggior parte delle persone che si sono espresse sono (giovani) adulte/i di età compresa tra 19 e 29 anni. La percentuale di persone che hanno già compiuto 35 anni è leggermente aumentata rispetto all'anno precedente.




Sesso (n=2'029)

Tra le persone che si sono espresse, sette su dieci sono di sesso maschile.



Formazione (n=2'619)


Oltre quattro quinti delle persone che si sono espresse hanno portato a termine una formazione. La percentuale di persone con un diploma di scuola universitaria è passata da 32% (2022) a 37% (2023). Inoltre, più di 4 persone su 5 stanno studiando e/o lavorando (questo dato non figura nell'illustrazione).



Esperienze e avvenimenti in seguito al consumo di sostanze psicoattive


Nel 2023 il 70% delle persone che hanno risposto al sondaggio fa stato di problemi psichici, il 61% di problemi fisici, il 46% di almeno un comportamento a rischio e il 41% di problemi sociali legati al consumo di sostanze psicoattive. Il 34% afferma di essere dipendente da sostanze.

Esperienze e avvenimenti in seguito al consumo di sostanze psicoattive (n=2'430 / risposte multiple possibili / dati indicati in percentuale)



Tra le persone che consumano o hanno consumato tabacco, il 72% dichiara di essere o di essere stato dipendente da questa sostanza. La dipendenza, presente o passata, è del 41% per la cannabis, del 21% per l'alcol, del 14% per la cocaina e del 5% per le benzodiazepine.


Dipendenza in funzione della sostanza consumata, selezione (n=1'595 con risposte valide / risposte multiple possibili)



Consumo misto

Due terzi delle persone che si sono espresse hanno consumato più di una sostanza nel corso dei 12 mesi precedenti il sondaggio. Tendenzialmente, si osserva un calo del consumo misto in tutte le fasce di età. Questo calo è più pronunciato tra le persone che non hanno ancora compiuto 18 anni (2022: 76%; 2023: 61%) e quelle che hanno già compiuto 35 anni (2022: 67%; 2023: 62%).

Percentuale di persone che hanno praticato un consumo misto nel corso dei 12 mesi precedenti il sondaggio, per età e sesso / n=numero di risposte valide




Il 7% delle persone che si sono espresse ha detto di aver praticato un consumo misto di benzodiazepine e alcol durante i 12 mesi precedenti il sondaggio. Attestandosi sul 15%, il consumo misto di queste due sostanze è significativamente più comune tra le ragazze e i ragazzi che non hanno ancora compiuto 18 anni rispetto alle altre fasce di età (questo dato non figura nell'illustrazione).

Prevalenza a 30 giorni del consumo di medicinali

La prevalenza a 30 giorni del consumo di medicinali tra le ragazze e i ragazzi che si sono espressi e che non hanno ancora compiuto 18 anni è nettamente superiore rispetto al campione totale.

Prevalenza a 30 giorni del consumo di medicinali: paragone tra la fascia più giovane e il campione totale / n=numero di risposte valide



Conclusioni

- La maggior parte delle persone che hanno risposto al sondaggio presenta un livello di istruzione elevato.
- Le sostanze più consumate risultano essere tabacco, cannabis e alcol.
- Da alcuni anni la prevalenza del consumo di ketamina è in aumento.
- Tra le ragazze e i ragazzi che non hanno ancora compiuto 18 anni, il consumo di medicinali è significativamente più elevato rispetto a quello del campione totale.
- Esperienze o avvenimenti negativi in seguito al consumo di sostanze psicoattive sono frequenti e la percentuale di persone che dichiarano di essere o di essere state dipendenti da una sostanza è elevata.
- Colpisce anche il fatto che solo poche persone vorrebbero cambiare qualcosa nelle loro abitudini per quanto concerne il consumo di cannabis e di cocaina (questo dato non figura nelle illustrazioni), nonostante il consumo di queste sostanze presenti una prevalenza e una frequenza elevate.